







MEDGEL

Használati útmutató, leírás

A MedGel és MedGel lap, egy puha, víztaszító, légáteresztő képességű szilikon zselé, amely öntapadó, egy láthatatlan kötés, ami finom hártát képez a bőrön.

Kétféle kiszerezésben kapható: szilikon gél lap, és hagyományos tubusos formában. A meglévő hegek kezelésére és megelőzésre is alkalmas.

A MedGel lapoknak négy formája létezik: fordított „T” lap (négyzet, téglalap), csík, korong alak. Az alábbi táblázatban látható:

Ábra	Hivatkozás sz.	Forma	Csomagolás egység	Méret
	1240-013I2	Fordított „T”	2	34 x 9,5 cm
	1240-010H	Lap	6	10 x10 cm
	1240-010I1		1	10 x 10 cm
	1240-016I1	Lap	1	10 x 5 cm
	1240-011H	Csík	12	30 x 2 cm
	1240-011I1		1	30 x 2 cm
	1240-011I2		2	30 x 2 cm
	1240-012H	Korong	12	Ø 70 mm
	1240-012I2		2	Ø 70 mm
	1230-015	Zselé	1	15 g

Az orvos feladata a megfelelő típus kiválasztása a legmagasabb szintű klinikai és esztétikai szempontok figyelembevételével.

Összetétel: A felhasznált alapanyagok, többek közt polixiloxan és oligomerikus sziloxán, orvosilag és biológiailag is biztonságosak, mindenben megfelelnek a nemzetközi követelményeknek. A gyártás környezetvédelmi körülményeit és a gyártástechnológiát minőségbiztosítási rendszerben ellenőrzött, összhangban az {FDA ([GMP])} és az ANVISA által előírt *Orvosi Termékek Gyártási Gyakorlatával*, valamint az ISO 9001 és ISO 13485 számú normákkal.

A szilikon színárnyalata az opálos szürkétől az áttetsző sárgáig terjedhet.

A MedGel lapok tapadási foka különböző lehet.

Kiszerezés: A MedGel lapok nem steril műanyag csomagolásban kaphatók 1, 2, 6, 10, vagy 12 darabos kiszerezésben. A zselé 15 g grammos tubusos csomagolásban. A külső papírdobozon található: a termék leírása, hivatkozási száma, darabszám, vonalkód, a gyártási dátum és az érvényesség ideje.

Leírás: Sebhelyek keletkezhetnek sebészeti beavatkozások, balesetek, égési sérülések, lézerkezelések, kozmetikai hámlasztás vagy dermabrázió során. A hipertrófiás heg az eredeti sebszövet határain belül marad, míg a keloidos heg a sebgyógyulásnál ezeket a határokat túllépi. Létezik még az erythema, amely a bőr abnormális pirosodását jelenti. A hipertrófiás heg kimetszése sokszor javít, de a keloidos heg csupán kimetszéssel való kezelése gyakran csak ront a helyzeten és a sebhely még nagyobb keloiddal gyógyul. A szilikongél és szilikongél lap a meglévő hegek kezelésére és megelőzésre is alkalmas. Különböző műtéti hegek (pl. plasztikai, has, szív műtétek, császármetszés) égések, pattanások, vágások, tetoválások, harapások nyomainak eltüntetésére, halványítására is kiválóan megfelel. Minél frissebb a hegesezés, annál jobb eredmény várható.

A MedGel lapok javasolt alkalmazása:

Lap alak: széles, elterjedt hegesezésekre, pl. égési sérülések

Csík alak: vonal formájú hegekre, pl. has plasztikából, nagyobbító, kisebbítő emlőplasztikából, császármetszésből, szív műtétekből eredőkre

Korong alak: kerek formájú hegekre, pl. emlőnagyobbító, kisebbítő műtétek, ciszták kivétele után

Fordított „T” alak: pl. emlőkisebítő műtétek után

A MedGel tubusos zselé: keloidok, erythema megelőzésére, kezelésére, hipertrófiás hegekre, nehezen elérhető (pl. fül mögött), nyílt helyekre (pl. kéz, arc, nyak) ajánlott. A zselé, az oxigénnel kapcsolatba kerülve, tartós, gázáteresztő filmréteget alkot. Az a tulajdonsága, hogy sminket lehet rátenni kivételesen alkalmas az arcon való használatra. Naponta legalább kétszer javasolt, vékony rétegben alkalmazni, varratszedést követően, vagy akár évekkel azután.

A MedGel növeli a komfortérzetet, diszkrét, könnyen felkenhető.

Ellenjavaslat: A szilikongél és szilikongél lap termékeket friss vagy nyílt sebekben reepitalizáció előtt nem lehet használni. Sebgyógyulási rendellenességek, fertőzések esetében, bőrre használt krémekkel, szemkörnyéken vagy nyálkahártyán nem lehet a szilikongél és szilikongél lap termékeket alkalmazni.

Figyelmeztetés

A termék szembe ne kerüljön. Kisgyermekek előtt elzárva tartandó.

A MedGel lap és zselé csak tiszta, száraz, lemosóktól és krémektől mentes bőrfelületen alkalmazható. Használat során ritkán előfordulhat viszketés, bőrpír, pattanások kialakulása, ez esetben a termék használatát fel kell függeszteni és javasolt szakorvossal konzultálni.

MedGel lapok használata

A minél jobb eredmény elérése érdekében, a lapokat naponta min. 12 óráig javasolt alkalmazni.

1. Alaposan tisztítsa meg a befedni kívánt felületet.
2. A MedGel lapot vegye ki a csomagolásából.
3. Vágjon a heget teljesen befedő darabot.
4. Húzza le a védőfóliát.
5. A lapot az öntapadós felével helyezze a hegre.
6. Ha szükséges rögzítse ragtapasszal vagy hálóval, de ne túl szorosan.
7. Minden nap semleges kémhatású szappanos, langyos, bő vízzel tisztítsa meg a MedGelt. Ne használjon mosószert.
8. Miután megszáradt helyezze vissza az alaposan megtisztított kezelendő bőrfelületre.
9. Húsz alkalom után ajánlott a MedGel lap cseréje.

A MedGel tubusos zselé használata

1. Alaposan tisztítsa és szárítsa meg a befedni kívánt felületet.
2. Vékony rétegben vigye fel a zselét. Ez egy átlátszó, víztaszító réteget képez a bőrön.
3. Naponta legalább kétszer ismételje meg az optimális eredmény elérésért.

A termék ruhára ne kerüljön, mert foltot hagy.

Fontos tudnivalók

A MedGel használata előtt javasolt orvosa véleményének kikérése.

A terméket csak ép, sértetlen csomagolás felbontása után használja.

A MedGel lapok porral, szőrrel, olajokkal, krémekkel ne érintkezzenek.

A már kibontott MedGel lapokat tiszta száraz helyen, a csomagolásba visszahelyezve tárolja.

A termék csomagolása nem steril, tisztántartása (bő, semleges kémhatású, szappanos vízzel) a felhasználó feladata. Ne alkalmazzon érdes felületet tisztításukkor.

Kedvezőtlen mellékhatások

Használat során ritkán előfordulhat viszketés, bőrpír, pattanások kialakulása, ez esetben a termék használatát fel kell függeszteni és javasolt szakorvossal konzultálni.

Tartósság

A MedGel lapokat ajánlott húsz alkalom után kicserélni. Gyakoribb cserére lehet szükség, ha a heg hajlatban (pl. könyök, térd), vagy dörzsölésnek kitett helyen van.

Tárolás, szállítás

A **SILIMED** cég termékei és termékcsomagolásai ellenállóak, és betartva a csomagoláson található utasításokat, szobahőmérsékleten tárolva, nem károsodhatnak. Ne szállítsák, vagy tárolják őket együtt más, olyan típusú anyagokkal, melyek fizikai vagy vegyi károsodásokat okozhatnak a termékben.

Garancia

A **SILIMED** cég bármely termékét kicseréli, amelynek hibája bizonyíthatóan gyártásból ered, feltéve, ha a kellő módon visszaszolgáltatót terméket előzetesen beszerző beazonosításra kerül, valamint a terméket a cég laboratóriumában bevizsgálta.

A fentebb felsorolásra került kedvezőtlen mellékhatások, a helytelen alkalmazás és a színárnyalatok meglévősége, melyről a „**Összetétel**” c. fejezetben volt szó, nem tekinthetők termékhibának.

A **SILIMED** cég termékek utáni jótállása nem vonatkozik olyan esetekre, amikor az orvos vagy a páciens önhatalmúlag a termékcsere mellett dönt.

Nyomon követés

A **SILIMED** cég minden egyes egységcsomagról, az alapanyagokról, a gyártási folyamat lépéseiről, a környezetvédelmi körülményekről, a minőségellenőrzés lefolytatásáról és annak, próbáiról pontos feljegyzéseket vezet, minden egyes terméket egyedi számmal ellátva, mely később bármikor minden kétséget kizáróan azonosíthatóvá teszi azt. Ezért fontos, hogy a terméket érintő bármely panaszt kísérje a reklamált termék LOT száma is, mely a csomagoláson megtalálható.

Információ, rendelés:

info@hender.hu

megrendeles@hender.hu